

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-3-72 295077

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN n° 138 de MARS 1972

28 Mars 1972 / n° 6

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du poirier -

A la suite du développement rapide de la végétation sur l'ensemble des variétés, il est vivement recommandé de renouveler la protection des arbres.

Tavelure du pommier -

Il est conseillé d'effectuer un premier traitement anti-tavelure sur toutes les variétés ayant atteint le stade C³ - D.

Oïdium du pommier -

Le temps chaud subi la semaine dernière a été favorable à ce champignon. Il est nécessaire d'adjoindre un anti-oïdium à la bouillie anti-tavelure.

Monilia sur cerisiers - (griotte plus particulièrement) - Pruniers (... Mirabelles)

Un traitement à l'aide d'un fongicide organique de synthèse est à effectuer le plus rapidement possible. En cas de période pluvieuse ne pas hésiter à renouveler la protection avant et pendant la fleur à l'aide de : Bénomyl 30 g., Captane 160 g., Méthylthio-phanate 70 g., Thiabendazole 40 g., Doguadine 70 g., Mancozèbe 160 g., Thirame 160 g. de M.A./Hl. (prendre connaissance attentivement des recommandations d'utilisation des fongicides).

Pucerons verts du pommiers ; Cheimatobie -

Les premières éclosions ont été observées; un insecticide peut être incorporé aux bouillies fongicides pour détruire ces premiers insectes.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles,

H. de MEIRLEIRE

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytosanitaire CHAMPAGNE,

J. DELATTRE

7379